

DEFINIZIONI DI CASO DI FEBBRE CHIKUNGUNYA
--

1. Caso possibile (presenza di criterio clinico)

febbre elevata (>38,5) ad esordio improvviso

e
artralgie gravi e invalidanti , non spiegabili con altre condizioni cliniche

Altri sintomi presenti con minore frequenza : rash cutaneo, astenia, mialgia, cefalea, prurito, nausea, vomito, manifestazioni emorragiche lievi, meningoencefalite (raramente)

2. Caso probabile (presenza di criterio clinico ed epidemiologico *)

*Criterio epidemiologico = essersi recato nei 15 giorni precedenti o essere residente in area italiana od estera con trasmissione locale di Chikungunya

3. Caso confermato (positività del criterio di laboratorio, indipendentemente dalle caratteristiche cliniche)**

DEFINIZIONI DI CASO DI FEBBRE DENGUE / DENGUE EMORRAGICA

1. Caso possibile (presenza di criterio clinico)**a) FEBBRE DENGUE :**

febbre elevata (>38,5) ad esordio improvviso della durata di 2-7 giorni

e
almeno due fra i seguenti sintomi: cefalea intensa e dolore retroorbitale , mialgie, artralgie, lombalgie, rash maculopapulare e manifestazioni emorragiche

b) DENGUE EMORRAGICA :

febbre o storia di febbre della durata di 2-7 giorni, tendenza all'emorragia, trombocitopenia, evidenza di aumentata permeabilità capillare (emoconcentrazione e/o versamento pleurico o ascite)

Gravi forme di Dengue possono essere caratterizzate anche da encefalopatia, encefalite, insufficienza epatica, cardiomiopatia.

2. Caso probabile (presenza di criterio clinico ed epidemiologico *)

*Criterio epidemiologico = essersi recato nei 15 giorni precedenti in area con trasmissione locale di Dengue

3. Caso confermato (positività del criterio di laboratorio **, indipendentemente dalle caratteristiche cliniche)

** Criterio di laboratorio :positività di almeno uno dei seguenti test :

- isolamento del virus** su un prelievo di sangue eseguito entro 5 giorni dall'inizio dei sintomi
- presenza di RNA virale alla RT-PCR** su un prelievo di sangue eseguito entro 5 giorni dall'esordio dei sintomi
- presenza di anticorpi specifici IgM** su un prelievo eseguito in fase acuta (entro 5 giorni) o post-acuta (entro 6- 30 giorni dall'inizio dei sintomi)
- sieroconversione o aumento di almeno 4 volte del titolo anticorpale** su prelievi di sangue effettuati a distanza di 2-3 settimane

N.B I test di laboratorio si effettuano nel laboratorio Regionale di riferimento c/o U.O di Microbiologia dell'Az.Ospedaliero-Universitaria di Bologna.